



49



vidora

ARNICA MONTANA VIDORA

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

Arnica montana Vidora

Arnica montana 4DH

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÃO

Forma farmacêutica: Solução oral, 1mL/mL

Frasco plástico opaco de 30 mL com batoque gotejador.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada 1 mL do produto contém:

Arnica montana 4DH alc. 45% (v/v).....1 mL

Excipientes: (álcool etílico e água purificada).

Gradação alcoólica final: 45%

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

“As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.”



O medicamento homeopático Arnica montana Vidora é indicado segundo a individualidade do paciente, ou seja, para tratar o conjunto de sintomas que caracterizam o quadro da doença. Conforme os experimentos feitos no homem sadio, a ação da substância ativa no indivíduo acarreta reações as quais representam a patogênese da substância. Com referência nestes sinais e sintomas observados e posteriormente descritos, a Arnica montana Vidora é aplicada na prática médica homeopática na busca do equilíbrio mental, emocional, físico e no fortalecimento da energia vital.

2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 12 anos.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Devido ao fato de conter álcool na composição, evitar o uso em pessoas sob tratamento com medicação incompatível com álcool ou em recuperação de alcoolismo.

3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou

do cirurgião-dentista.

Este medicamento contém 45% de álcool (etanol) e pode causar intoxicação, especialmente em crianças.

Interações podem ocorrer com medicação incompatível com álcool quando administradas ao mesmo tempo. Ainda não foram registradas interações no uso deste medicamento associado a alimentos ou bebidas alcoólicas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

4. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo. Após aberto, válido por 12 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

O medicamento apresenta-se na forma líquida, incolor, límpido e com odor alcoólico. Após diluído, possui leve sabor alcoólico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

5. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADULTOS E CRIANÇAS ACIMA DE 12 ANOS: 20 gotas.

Colocar a quantidade em gotas em um pouco d'água potável (50 mL), antes do uso.

Tomar 3 vezes ao dia, no intervalo de 8 em 8 horas.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada (via oral). O uso por outras vias pode envolver riscos e deve estar sob a responsabilidade do prescritor. Pacientes idosos ou debilitados podem requerer doses inferiores às dos outros adultos. Nestes casos, o médico deverá ser consultado.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas/colaterais assim como possíveis agravações deste medicamento. **Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações. Mantenha**

sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 05 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

6. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de tomar a dose no horário estabelecido pelo seu médico, tome-a assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de tomar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas/colaterais assim como possíveis agravações deste medicamento. **Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou

farmacêutico.

8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato para que sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Notificado e produzido por:

VIDORA FARMACÊUTICALTDA.

Rua Alberto Rangel, 823 - Rubem Berta - Porto Alegre - RS

CNPJ: 92.762.277/0001-70

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC nº 721/2022.

Farm. Resp.: Daniel P. Lewgoy - CRF-RS nº 6583 INDÚSTRIABRASILEIRA

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.



SAC
0800 080 0900
www.vidora.com.br

Gráfica
Costa
02310009
Rev 13 P02